

LA BRÛLURE PHOMOPSIENNE DANS LES CONIFÈRES

Cette maladie est fréquente sur les genévriers et quelquefois sur les thuyas. Elle se manifeste par l'apparition de plusieurs petites branches jaunes qui deviennent noirâtres avec le temps. Les genévriers érigés sont souvent affectés à la suite d'un hiver difficile. La dessiccation hivernale prédispose les plants à cette maladie qui se développe très rapidement par temps humide.

- Évitez de tailler régulièrement les genévriers pour ne pas favoriser le développement de la maladie.
- Espacez suffisamment les plants lors de la plantation pour accélérer l'assèchement du feuillage.
- Évitez les applications d'engrais riche en azote (1er chiffre plus élevé) en fin de saison
- Éliminez rapidement les branches affectées en taillant 15 cm dans le bois sain (photo). Il est préférable de tailler en période sèche.



- Taille de l'extrémité d'une branche de conifère
- Désinfectez le sécateur à l'aide d'alcool à friction (70 %) entre chaque coupe.
- Une pulvérisation des plants avec un produit contenant du cuivre peut aider à corriger le problème. Ces traitements sont surtout utiles lorsqu'il pleut fréquemment, car la maladie se développe rapidement.
- Une fertilisation d'appoint avec un engrais riche en potassium permet d'amoinrir le problème, surtout dans le cas où le plant n'a pas été fertilisé depuis quelques années.