

## LE RETOUR DU HANNETON

Plusieurs municipalités de la région métropolitaine, Montréal en tête, rappellent que la meilleure période pour entreprendre la lutte biologique contre les larves de hannetons, à l'aide de nématodes, s'étale de la mi-août jusqu'à la fin septembre. C'est le moment où les larves, issues de la ponte de la fin juillet, deviennent très actives.

Favorable à cette lutte écologique, la Ville de Montréal devrait cependant préciser dans ses messages que les nématodes sont souvent inefficaces, faute d'un usage adéquat. Et dans un sol argileux comme c'est le cas dans le bassin du Saint-Laurent, les résultats sont encore plus faibles.

L'agronome, Louis Simard, d'Agriculture et agroalimentaire Canada, à Saint-Jean-sur-Richelieu, spécialiste de la lutte aux hannetons, donne ici quelques conseils importants à suivre pour une éradication maximale des hannetons dans la pelouse:

- L'espèce de nématode la plus efficace est *Heterorhaptidis bacteriophora*. Un nom à retenir.
- C'est une petite bête sensible. Évitez de l'exposer à la chaleur, notamment dans l'auto. Entreposez les nématodes au frigo et avant l'achat, vérifiez la date de péremption.
- Arrosez abondamment avant, pendant et après le traitement. L'eau permet au parasite microscopique d'atteindre sa cible. Profitez d'une période de pluie abondante pour agir.
- Jamais de traitement par temps ensoleillé. Les rayons ultraviolets causent la mort des nématodes.
- Enlevez tous les filtres du pulvérisateur ou de l'arrosoir.
- Brassez régulièrement la solution d'eau et de poudre de nématodes, sinon les parasites vont se noyer faute d'oxygène. Recommandation très importante et la plupart du temps négligée.
- En septembre, fertilisez votre gazon afin d'assurer une meilleure survie aux graminées affaiblies par la présence des hannetons.