



Pyrale des prés

Description

Les adultes sont des petits papillons de couleur crème d'environ 1 cm de long. Les larves sont des petites chenilles beiges de 6 à 20 mm de long. Les chenilles se cachent le jour dans des tunnels de fils de soie tissés à la surface du sol qu'elles quittent la nuit et tôt le matin pour se nourrir. Vous pouvez les voir le soir avec une lampe de poche ou si vous arrosez avec de l'eau savonneuse. La présence d'oiseaux peut être un indice.

Caractéristiques

Petits papillons crème qui volent en zigzaguant le soir juste au-dessus de la pelouse, au printemps. Le papillon replie ses ailes le long de son corps lorsqu'il atterrit au lieu de les laisser déployées.

Cycle de vie

Les papillons pondent leurs œufs au printemps. Les petites chenilles (larves) émergent des œufs environ 2 semaines plus tard et commencent à se nourrir à la base des tiges du gazon. Lorsque leur croissance est suffisante, elles se transforment en pupes pour passer l'hiver et émergent au printemps suivant. La femelle laisse tomber ses œufs en vol au-dessus du gazon. Il peut y avoir 2 générations par année à l'occasion.

Dommmages causés

La base des tiges et du feuillage est mangée (le feuillage s'arrache comme une poignée de cheveux si on tire dessus) à partir du début de mai. Il en résulte de petites plaques jaunes qui s'agrandissent au fil des semaines. Les dommages sont plus évidents à la fin août/début septembre.

Les pyrales peuvent endommager de grandes surfaces en quelques jours. Elle s'attaquent surtout aux pelouses très courtes.

Prévention

- Éviter les accumulations de chaume
- Maintenir la pelouse longue et vigoureuse, 3 cm
- Puisque les racines ne sont pas attaquées, la pelouse sera en mesure de repousser si l'infestation n'est pas trop importante

Moyens de lutte

- Intervenir de préférence sur une pelouse humide, le soir alors que les insectes sont actifs. Ne pas tondre dans les jours qui suivent le traitement.
- Le *Bacillus thuringiensis* (B.t.) , les nématodes et le carbaryl sont efficace contre les chenilles.

Si vous voyez des papillons, attendez 2 semaines avant de traiter avec le B.t., les nématodes ou le carbaryl. Traitez aussi au printemps suivant, en mai, avec le B.t. ou carbaryl.

- L'épandage de cendre de bois, de chaux ou de farine de seigle sur les chenilles les font mourir par asphyxie.
- Réensemencer les zone atteintes avec des semences comportant des champignons endophytes. Les chenilles aiment bien la présence du chaume. Si l'infestation est grave déchaumez et aérez la pelouse puis ensemencez.